

## MANOVRE DISOSTRUZIONE E RIANIMAZIONE PEDIATRICHE

### INFANTE - DA 0 A 1 ANNO

Se emette suoni: respira, tossisce o piange  
NON ESEGUIRE LE MANOVRE



#### Ostruzione Totale

Alternare 5 pacche interscapolari a 5 compressioni toraciche

##### LE PACCHE:

Posizionare l'infante sul braccio a cavalluccio, e poggiarlo sulla gamba. Con il palmo della mano dare 5 pacche tra le scapole.

##### LE COMPRESSIONI:

Posizionare due dita al centro dei due capezzoli. Effettuare 5 compressioni lente e profonde (circa 4 cm).

Ripetere le manovre fino a disostruzione avvenuta o perdita di coscienza.



#### Incosciente che non Respira


Dopo 2 minuti di RCP, se qualcuno non lo ha già fatto,  
**CHIAMARE IL 112**

Posizionare il lattante su un piano rigido rialzato e scoprire il torace. Posizionare indice e medio al centro dei due capezzoli ed effettuare 30 compressioni:

- ritmo 100/120 al minuto
- comprimere 1/3 della profondità del torace

#### 2 ventilazioni:

- controllare presenza di corpi estranei nella bocca, se affioranti rimuoverli
  - posizionare la propria bocca su bocca e naso del lattante
  - soffiare delicatamente
- Ripetere 30 compressioni e 2 ventilazioni fino all'arrivo dei soccorsi o ripresa di coscienza.



### BAMBINO - DA 1 ANNO ALLA PUBERTÀ

Se emette suoni: respira, tossisce o piange  
NON ESEGUIRE LE MANOVRE



#### Ostruzione Totale

Posizionarsi dietro al bambino facendo aderire la sua schiena al proprio fianco.

Mettere un pollice alla fine dello sterno e l'indice sull'ombelico, creando una "C" con le dita. Con l'altra mano fare un pugno, e posizionarlo al centro della "C".

Staccare la prima mano, posizionarla sul pugno ed effettuare delle compressioni da fuori a dentro e dal basso verso l'alto, fino a disostruzione avvenuta o perdita di coscienza.

#### MANOVRA DI HEIMLICH



#### Incosciente che non Respira

Dopo 2 minuti di RCP, se qualcuno non lo ha già fatto,  
**CHIAMARE IL 112**

Posizionare il bambino su un piano rigido e scoprire il torace. Posizionare una mano sulla metà inferiore dello sterno (centro del torace).

- 30 compressioni: - ritmo 100/120 al minuto
- comprimere circa 5 cm

#### 2 ventilazioni:

- controllare presenza di corpi estranei nella bocca, se affioranti rimuoverli
  - Effettuare una modica estensione del capo
  - posizionare la propria bocca sulla bocca del bambino
  - chiudere le narici con pollice e indice della mano
  - effettuare 2 ventilazioni
- Ripetere 30 compressioni 2 ventilazioni fino all'arrivo dei soccorsi o ripresa di coscienza.



#### Cosa NON fare

##### INFANTE



##### BAMBINO



#### 10 REGOLE PER RIDURRE LE MORTI IN CULLA



tizianoformazione.it/sids  
GUARDA IL VIDEO



La tua  
FORMAZIONE  
a 360°

BLS-D

Disostruzione

Primo Soccorso Pediatrico

Corsi Pre e Post Parto

Corso Trauma

ECM per Sanitari

Sicurezza sul lavoro

HACCP

Privacy

DVR

Recupero Anni Scolastici

Università Telematica

Patente Informatica

Certificazioni EIPASS

Corsi On-line

Educazione Digitale

Salute Cane e Gatto

Corsi per Bed&Breakfast

