

MANOVRE DISOSTRUZIONE E RIANIMAZIONE PEDIATRICHE

INFANTE - DA 0 A 1 ANNO

Se emette suoni: respira, tossisce o piange
NON ESEGUIRE LE MANOVRE



Ostruzione Totale

Alternare 5 pacche interscapolari a 5 compressioni toraciche

LE PACCHE:
Posizionare l'infante sul braccio a cavalluccio, e poggiarlo sulla gamba.
Con il palmo della mano dare 5 pacche tra le scapole.

LE COMPRESIONI:
Posizionare due dita al centro dei due capezzoli. Effettuare 5 compressioni lente e profonde (circa 4 cm).

Ripetere le manovre fino a disostruzione avvenuta o perdita di coscienza



Incosciente che non Respira

Dopo 2 minuti di RCP, se qualcuno non lo ha già fatto,
CHIAMARE IL 112

Posizionare il lattante su un piano rigido rialzato e scoprire il torace. Posizionare indice e medio al centro dei due capezzoli ed effettuare 30 compressioni:
- ritmo 100/120 al minuto
- comprimere 1/3 della profondità del torace

2 ventilazioni:
- controllare presenza di corpi estranei nella bocca, se affioranti rimuoverli
- posizionare la propria bocca su bocca e naso del lattante
- soffiare delicatamente
Ripetere 30 compressioni e 2 ventilazioni fino all'arrivo dei soccorsi o ripresa di coscienza



FORMAZIONE
a 300

BLS-D

Disostruzione

Primo Soccorso Pediatrico

Corsi Pre e Post Parto

Corso Trauma

ECM per Sanitari

Sicurezza sul lavoro

HACCP

Privacy

DVR

Recupero Anni Scolastici

Università Telematica

Patente Informatica

Certificazioni EIPASS

Corsi On-line

Educazione Digitale

Salute Cane e Gatto

Corsi per Bed&Breakfast

BAMBINO - DA 1 ANNO ALLA PUBERTÀ

Se emette suoni: respira, tossisce o piange
NON ESEGUIRE LE MANOVRE



Ostruzione Totale

Posizionarsi dietro al bambino facendo aderire la sua schiena al proprio fianco. Mettere un pollice alla fine dello sterno e l'indice sull'ombelico, creando una "C" con le dita. Con l'altra mano fare un pugno, e posizionarlo al centro della "C". Staccare la prima mano, posizionarla sul pugno ed effettuare delle compressioni da fuori a dentro e dal basso verso l'alto, fino a disostruzione avvenuta o perdita di coscienza

MANOVRA DI HEIMLICH



Incosciente che non Respira

Dopo 2 minuti di RCP, se qualcuno non lo ha già fatto,
CHIAMARE IL 112

Posizionare il bambino su un piano rigido e scoprire il torace. Posizionare una mano sulla metà inferiore dello sterno (centro del torace).
30 compressioni: - ritmo 100/120 al minuto
- comprimere circa 5 cm

2 ventilazioni:
- controllare presenza di corpi estranei nella bocca, se affioranti rimuoverli
- Effettuare una modica estensione del capo
- posizionare la propria bocca sulla bocca del bambino
- chiudere le narici con pollice e indice della mano
- effettuare 2 ventilazioni
Ripetere 30 compressioni 2 ventilazioni fino all'arrivo dei soccorsi o ripresa di coscienza



Cosa NON fare

- INFANTE**
- SCUOTERLO
Sindrome bambino scosso
 - METTERLO A TESTA IN GIÙ
- BAMBINO**
- GUARDA L'UCCELLINO
 - FARLO VOMITARE
 - FARLO BERE

10 REGOLE PER RIDURRE LE MORTI IN CULLA

